

ประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์



ผลการสำรวจที่สำคัญ

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
พ.ศ. 2555



NSO
สำนักงานสถิติแห่งชาติ



UNICEF
องค์การยูนิเซฟ



MOPH
กระทรวงสาธารณสุข



NHISO
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



THPF
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



IHPP
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

MICS

ประเทศไทย

รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการสำรวจที่สำคัญ

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
พ.ศ. 2555



NSO
สำนักงานสถิติแห่งชาติ



UNICEF
องค์การยูนิเซฟ



MOPH
กระทรวงสาธารณสุข



NHSA
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



THPF
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



IHPP
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ



การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
พ.ศ. 2555

NSO
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

UNICEF
องค์การยูนิเซฟ

MOPH
กระทรวงสาธารณสุข

NHSO
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

THPF
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

IHPP
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

พฤศจิกายน 2556

คำนำ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งที่ 2 (MICS 4) ในเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 หลังจากที่จัดทำครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ.2548 - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 (MICS 3) ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ องค์การยูนิเซฟ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รวมทั้งจัดทำตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมาย การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The Millennium Development Goals-MDG) เป้าหมายของโลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก (A World Fit for Children - WFFC) และเป้าหมายอื่นๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และเพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอแสดงความขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้ ได้แก่ องค์การยูนิเซฟ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ



ผลการสำรวจที่สำคัญ

โภชนาการ

ภาวะโภชนาการ

- เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีภาวะทุพโภชนาการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ความสูงเมื่อเทียบกับอายุต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (เตี้ย) ร้อยละ 16 น้ำหนักเทียบกับอายุต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 9 และน้ำหนักเทียบกับความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ผอม) ร้อยละ 7
- เด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีภาวะทุพโภชนาการเรื่องน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเตี้ยในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น เด็กที่แม่ไม่มีการศึกษามีภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 14 และมีภาวะเตี้ยแคระแกร็นร้อยละ 34 เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน มีภาวะทุพโภชนาการสูงกว่าเด็กในกลุ่มอายุอื่น โดยเป็นเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 18 มีภาวะเตี้ยร้อยละ 19 และมีภาวะผอมร้อยละ 16
- เด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนมาก มีภาวะเตี้ยแคระแกร็นและน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสูงกว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ร่ำรวยมาก
- ประมาณร้อยละ 11 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมีภาวะอ้วน โดยพบว่าเด็กในครัวเรือนที่ร่ำรวยมากและครัวเรือนที่แม่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา มีภาวะอ้วนในสัดส่วนที่สูงกว่าเด็กในกลุ่มอื่น ๆ ภาคกลางมีภาวะเด็กอ้วนสูงสุด รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร และต่ำสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

- เด็กที่กินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอดมีร้อยละ 46 โดยภาคใต้มีสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 61 ส่วนกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนต่ำสุด คือ ร้อยละ 29 เด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนมากได้กินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอดสูงกว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ร่ำรวย คิดเป็นร้อยละ 51 และ 34 ตามลำดับ
- เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียวมีประมาณร้อยละ 12
- เด็กที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคกลางที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียวมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8 ซึ่งต่ำกว่าภาคอื่น ๆ ในขณะที่ภาคเหนือเด็กที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียวมีสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 20 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 14 และ 12 ตามลำดับ
- เด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ร่ำรวยมากมีเพียงร้อยละ 9 ที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียวซึ่งต่ำกว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนมากอย่างเห็นได้ชัด (ร้อยละ 16)
- เด็กผู้หญิงมีสัดส่วนของกินนมแม่เพียงอย่างเดียวถึงร้อยละ 16 ในขณะที่เด็กผู้ชายมีเพียงร้อยละ 10
- เด็กอายุ 6-23 เดือนได้รับอาหารอย่างเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 24

การบริโภคเกลือไอโอดีน

- ร้อยละ 71 ของครัวเรือนบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนที่เพียงพอ (15+ ppm.) ครัวเรือนที่ร่ำรวยมากบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนสูงกว่าครัวเรือนที่ยากจนมากอย่างเห็นได้ชัด (ร้อยละ 87 และ 54 ตามลำดับ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอต่ำสุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ (ร้อยละ 54) โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งมีสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 82 มากกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 73) ของครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอ ซึ่งมากกว่าครัวเรือนที่อยู่นอกเขตเทศบาลที่มีเพียงร้อยละ 69

น้ำหนักแรกคลอดต่ำ

- ร้อยละ 8 ของเด็กมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 2,500 กรัม เด็กที่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนของเด็กที่มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำในระดับที่สูงกว่าระดับประเทศ สัดส่วนของน้ำหนักแรกคลอดต่ำเมื่อจำแนกตามพื้นที่อยู่อาศัยและการศึกษาของแม่ไม่แตกต่างกันมากนัก

สุขภาพของเด็ก

การได้รับวัคซีน

- เกือบร้อยละ 98 ของเด็กอายุ 12-23 เดือนในประเทศไทยได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรค
- เด็กร้อยละ 89 ได้รับวัคซีนป้องกันโปลิโอเข็มที่ 3 ร้อยละ 88 ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และร้อยละ 92 ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ในรูปแบบวัคซีนรวม (หัด หัดเยอรมัน คางทูม)
- ร้อยละ 75 ของเด็กได้รับวัคซีนที่แนะนำให้ฉีดครบทั้ง 8 ชนิด
- การได้รับวัคซีนมีความแตกต่างกันระหว่างภาค โดยพบว่าเด็กในกรุงเทพมหานครมีส่วนของการได้รับวัคซีนทุกประเภทต่ำสุด คือ ร้อยละ 63 ในขณะที่ภาคเหนือมีส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 88 เด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาลได้รับวัคซีนครบทุกประเภท คิดเป็นร้อยละ 85 ส่วนเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 75
- เด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนมากได้รับวัคซีนครบสูงกว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนรวยมาก คือ คิดเป็นร้อยละ 89 และ 70 ตามลำดับ

วัคซีนป้องกันบาดทะยัก

- ในภาพรวมสตรีร้อยละ 76 ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักระหว่างตั้งครรภ์ โดยร้อยละ 71 ของสตรีได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ระหว่างการตั้งครรภ์ครั้งสุดท้าย
- สตรีในกรุงเทพมหานครร้อยละ 85 ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ซึ่งสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ โดยสัดส่วนของสตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับวัคซีนต่ำสุด คือ คิดเป็นร้อยละ 72
- สตรีที่มีการศึกษาในระดับต่างกันและสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนต่างก็มีสัดส่วนของการได้รับวัคซีนต่างกันด้วย

การได้รับสารละลายเกลือแร่

- ร้อยละ 5 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมีอาการท้องร่วงในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการสัมภาษณ์ ซึ่งจัดว่าค่อนข้างต่ำ โดยพบสัดส่วนของเด็กที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลสูงกว่าในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 6 และ 4 ตามลำดับ
- แนวทางการรักษาโดยการใช้สารละลายเกลือแร่ค่อนข้างต่ำ คิดเป็นร้อยละ 64 โดยภาคเหนือและภาคใต้ต่ำกว่าภาคอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด คือ มีการใช้สารละลายเกลือแร่เพียงร้อยละ 49
- ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็ก (ร้อยละ 53) ซึ่งป่วยด้วยโรคท้องร่วงในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนวันสัมภาษณ์ได้รับ ORT และยังคงให้อาหารอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าสัดส่วนต่ำมากในเด็กอายุ 0-11 เดือน (ร้อยละ 37)

การรักษาโรคปอดบวม

- มีเพียงร้อยละ 2 ของเด็กอายุ 0-59 เดือนที่ป่วยเป็นโรคปอดบวมในช่วงสองสัปดาห์ก่อนวันสัมภาษณ์โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 83 ได้รับการรักษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความรู้

การใช้เชื้อเพลิงแข็ง

- ประมาณ 1 ใน 4 ของครัวเรือน (ร้อยละ 26) ใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร โดยพบสูงสุดในครัวเรือนที่ยากจนมาก (ร้อยละ 82) ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 54) ครัวเรือนที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 35) และพบว่าครัวเรือนใช้ไม้ฟืนในการประกอบอาหาร คิดเป็นร้อยละ 11 ในขณะที่ส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) ในการประกอบอาหาร
- 3 ใน 4 ของครัวเรือน (ร้อยละ 75) ทำอาหารในบริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ เช่น ห้องครัวหรือทำอาหารกลางแจ้งหรือในอาคารแยกต่างหากจากตัวบ้าน ส่วนที่เหลือคือร้อยละ 25 ทำอาหารในพื้นที่อื่น ๆ ภายในบ้าน

น้ำดื่มและการกำจัดสิ่งขับถ่าย

- ครั้วเรือนเกือบทั้งหมดมีน้ำดื่มที่สะอาดและมีการกำจัดสิ่งขับถ่ายอย่างถูกต้องลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 97 และ 99 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคหรือเขตที่อยู่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
- น้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำฝนคือแหล่งน้ำดื่มหลักที่ประชากรใช้ดื่ม โดยพบว่าครั้วเรือนที่อยู่นอกเขตเทศบาลส่วนใหญ่ดื่มน้ำฝน ส่วนครั้วเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ดื่มน้ำบรรจุขวด

การกำจัดอุจจาระเด็ก

- ครั้วเรือนที่มีการกำจัดอุจจาระเด็กที่ปลอดภัยมีร้อยละ 57 โดยสัดส่วนต่ำที่สุดพบในกรุงเทพมหานครและภาคใต้ (ร้อยละ 45) ประมาณครึ่งหนึ่งของครั้วเรือนที่ร่ำรวยมาก (ร้อยละ 50) ที่งูจจาระเด็กลงในถังขยะ ในขณะที่ครั้วเรือนที่ยากจนมากมีเพียงร้อยละ 14

อนามัยเจริญพันธุ์

การคุมกำเนิด

- อัตราเจริญพันธุ์ในช่วง 1 ปีก่อนหน้าการสำรวจ คือ เกิด 1.8 คนต่อหญิง 1 คน อัตราเจริญพันธุ์ของสตรีที่อยู่นอกเขตเทศบาล คือ เกิด 2.1 คนต่อสตรี 1 คนซึ่งสูงกว่าในเขตเทศบาล (เกิด 1.5 คนต่อสตรี 1 คน) สตรีที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามีอัตราเจริญพันธุ์รวม คือ 2.9 ซึ่งสูงกว่าในภาพรวมระดับประเทศ
- อัตราเกิดของสตรีวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี คือ 60 คนต่อสตรี 1,000 คน โดยพบว่าสตรีที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามีอัตราเกิดสูงสุดเมื่อเทียบกับระดับการศึกษาอื่นคือ 224 คนต่อสตรี 1,000 คน สตรีที่ยากจนมากมีอัตราเกิด 85 คนต่อสตรี 1,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าสตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับอื่น ๆ
- ในภาพรวมสตรีอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 9 มีบุตรแล้ว ร้อยละ 2 กำลังตั้งครรภ์บุตรคนแรก และร้อยละ 11 เริ่มมีภาวะดูแลบุตร นอกจากนี้พบว่าสัดส่วนของสตรีอายุ 15-19 ปีที่ให้กำเนิดบุตรก่อนอายุ 15 ปีมีน้อยกว่าร้อยละ 1
- สตรีอายุ 15-49 ปีที่สมรสหรือมีคู่แล้วในปัจจุบันประมาณร้อยละ 79 กำลังคุมกำเนิดโดยพบว่าในภาคใต้อัตราคุมกำเนิดต่ำสุด คือ ร้อยละ 70 วิธีการสมัยใหม่เป็นที่นิยมใช้มากกว่าดั้งเดิมคิดเป็นร้อยละ 77 และร้อยละ 2 ตามลำดับ สตรีที่ยังไม่เคยมีบุตรมีความเป็นไปได้ที่จะคุมกำเนิดน้อยกว่าสตรีที่เคยมีบุตรแล้ว

ความต้องการที่ยังไม่สมฤทธิ์

- ร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 15-49 ปีที่สมรส/มีคู่ มีความต้องการที่สมฤทธิ์สำหรับการคุมกำเนิด โดยร้อยละ 17 สมฤทธิ์ผลด้านการเว้นระยะห่างของการมีบุตร และร้อยละ 63 สมฤทธิ์ผลด้านการจำกัดจำนวนบุตร
- เพียงร้อยละ 7 ของสตรีอายุ 15-49 ปีที่สมรส/มีคู่ มีความต้องการที่ไม่สมฤทธิ์สำหรับการคุมกำเนิด โดยพบสัดส่วนสูงสุดของสตรีที่อยู่ในภาคใต้ (ร้อยละ 13) และสตรีวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (ร้อยละ 12) นอกจากนี้ พบว่าสตรีในภาคใต้มีความต้องการในการคุมกำเนิดที่พึงพอใจในระดับต่ำกว่าสตรีในภาคอื่น ๆ (ร้อยละ 85 ในภาคใต้และมากกว่าร้อยละ 90 ในภาคอื่น ๆ)

การฝากครรภ์

- สตรีที่มีอายุ 15-49 ปีที่ให้กำเนิดบุตรภายใน 2 ปีที่ผ่านมา ก่อนการสำรวจได้รับการตรวจครรภ์ร้อยละ 98 และส่วนใหญ่ได้รับการดูแลโดยผู้ชำนาญการ
- ร้อยละ 93 ของสตรีที่ฝากครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ 4 ครั้งขึ้นไป โดยสัดส่วนต่ำสุดพบในสตรีที่ไม่มีการศึกษาและสตรีในครั้วเรือนที่มีฐานะยากจนมาก (ร้อยละ 87 และร้อยละ 86 ตามลำดับ)

ผู้ช่วยทำคลอด

- การคลอดเกือบทั้งหมดในช่วง 2 ปีก่อนการสัมภาษณ์ทำคลอดโดยผู้ชำนาญการ โดยพบว่าผู้ช่วยทำคลอดเป็นพยาบาล/ผดุงครรภ์ร้อยละ 78 เป็นแพทย์ร้อยละ 14 และประมาณร้อยละ 7 เป็นเจ้าหน้าที่สถานีนามัย/ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยผดุงครรภ์ ส่วนสตรีที่ผู้ช่วยทำคลอดคือหมอตำแยมีเพียงร้อยละ 0.1

พัฒนาการของเด็ก

- ร้อยละ 93 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่อยู่ในระหว่าง 3 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีสมาชิกภายในครัวเรือนที่อายุ 15 ปีขึ้นไปร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนอย่างน้อย 4 กิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยของกิจกรรมที่ร่วมกันทำ คือ 5.4 กิจกรรม สำหรับจำนวนกิจกรรมโดยเฉลี่ยที่พ่อแม่มีส่วนร่วมมีเพียง 1.1 เท่านั้น นอกจากนี้พบว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนมาก และครัวเรือนที่พ่อและแม่มีการศึกษาน้อยจะทำกิจกรรมร่วมกับเด็กต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
- เด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่มีหนังสือสำหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่มมีเพียงร้อยละ 43 โดยพบสัดส่วนต่ำสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 34) เด็กในครัวเรือนที่ยากจนมากมีเพียงร้อยละ 24 ที่มีหนังสือสำหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่ม ในขณะที่เด็กในครัวเรือนที่ร่ำรวยมากมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 71
- ร้อยละ 71 ของเด็กอายุ 0-59 เดือนมีของเล่นอย่างน้อย 2 ประเภท สำหรับเล่น/มีอยู่ในบ้าน
- ร้อยละ 5 ของเด็กขาดการดูแลที่เหมาะสมในช่วงสัปดาห์ก่อนการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะเด็กในครัวเรือนที่ยากจนมาก พบว่าสัดส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือร้อยละ 7
- ร้อยละ 92 ของเด็กอายุ 36-59 เดือนมีพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งด้านร่างกาย การอ่าน อารมณ์ และการเรียนรู้ โดยพบว่าเด็กที่มีพัฒนาการด้านการอ่านมีสัดส่วนต่ำสุดคือร้อยละ 63 เปรียบเทียบกับพัฒนาการด้านร่างกาย ร้อยละ 97 พัฒนาการด้านอารมณ์ร้อยละ 87 และพัฒนาการด้านการเรียนรู้ร้อยละ 97 ซึ่งจากผลการสำรวจพบว่าเด็กที่เข้าเรียนระดับก่อนปฐมวัยจะมีพัฒนาการสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน (ร้อยละ 94 และ 77 ตามลำดับ)

การศึกษา

ความพร้อมในการเข้าเรียน

- ร้อยละ 84 ของเด็กอายุ 36-59 เดือน กำลังเรียนในระดับก่อนวัยเรียน ความแตกต่างปรากฏชัดเจนระหว่างเด็กที่แม่มีการศึกษาในระดับที่ต่างกัน โดยพบว่าเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษาเข้าเรียนร้อยละ 75 และเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาที่เพิ่มขึ้น และสูงสุดสำหรับแม่มีการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา (ร้อยละ 87) สัดส่วนของการเข้าเรียนในระดับก่อนวัยเรียนของเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 87) สูงกว่าเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 80) สัดส่วนเด็กที่เรียนก่อนวัยเรียนอายุ 36-47 เดือนน้อยกว่าเด็ก 48-59 เดือน (ร้อยละ 75 และ 93 ตามลำดับ)

การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

- ร้อยละ 75 ของเด็กที่อยู่ในวัยเรียนประถมศึกษา กำลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยพบว่าสัดส่วนที่ต่ำสุดคือเด็กที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 70) เด็กที่มีแม่ไม่มีการศึกษา (ร้อยละ 59) และเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนมาก (ร้อยละ 65)
- ร้อยละ 96 ของเด็กในวัยเรียนประถมศึกษา กำลังเรียนในระดับประถมศึกษาขึ้นไป
- ร้อยละ 79 ของเด็กที่อยู่ในวัยเรียนมัศึกษากำลังเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่า โดยพบความแตกต่างของการเข้าเรียนอย่างเห็นได้ชัดระหว่างครัวเรือนที่ยากจนมาก (ร้อยละ 74) และครัวเรือนที่ร่ำรวยมาก (ร้อยละ 91) เด็กที่อาศัยอยู่ในภาคใต้และภาคกลางเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาในสัดส่วนที่ต่ำกว่าภาคอื่น (ร้อยละ 71 และ 77 ตามลำดับ)

- เด็กที่เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกือบทั้งหมดเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ร้อยละ 99 ของเด็กที่เรียนจบระดับประถมศึกษาเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา
- อัตราส่วนของหญิงต่อชายที่กำลังเรียนในระดับประถมศึกษา คือ 1.0 ซึ่งเห็นว่าไม่มีความแตกต่างของการเข้าเรียนระหว่างเพศชายและเพศหญิง แต่อัตราส่วนนี้ในระดับมัธยมศึกษา คือ 1.2 ซึ่งเห็นว่าเพศหญิงมีการเรียนในระดับมัศึกษามากกว่าเพศชาย

การรู้หนังสือ

- ร้อยละ 98 ของสตรีอายุ 15-24 ปีเป็นผู้รู้หนังสือ โดยพบสัดส่วนต่ำสุดในสตรีที่อาศัยในครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนไม่ใช่คนไทย คือ มีเพียงร้อยละ 48 ที่รู้หนังสือ สัดส่วนของการรู้หนังสือเมื่อจำแนกตามภาค อายุ และฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

การคุ้มครองเด็ก

การจดทะเบียนเกิด

- เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเกือบทั้งหมดจดทะเบียนเกิด และพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องการจดทะเบียนเกิด เมื่อพิจารณาตามเพศ อายุ การศึกษา แต่พบว่าเด็กในครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนไม่ใช่คนไทยมีการจดทะเบียนเกิดต่ำกว่าเด็กอื่น ๆ (ร้อยละ 79) โดยเด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนเกิดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72) แม่หรือผู้ดูแลไม่ทราบหลังจากที่ได้ไปรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลแล้วต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อรับสูติบัตรตามกฎหมาย

การสมรสตั้งแต่อายุน้อย

- สัดส่วนของสตรีอายุ 15-49 ปีที่แต่งงานก่อนอายุ 15 ปีมีค่าประมาณร้อยละ 3 สตรีอายุ 15-19 ปีที่ขณะนี้สมรส/มีคู่แล้วมีประมาณร้อยละ 16 โดยพบว่าสัดส่วนสูงมากในสตรีที่ยากจนมาก (ร้อยละ 23) สตรีที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 19) สตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 18) นอกจากนี้ยังพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสตรี (ร้อยละ 59) ในกลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาสมรสแล้ว
- ร้อยละ 11 ของสตรีอายุ 15-19 ปีสมรสกับคู่ที่อายุแก่กว่า 10 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะสตรีที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 23

ความรุนแรงในครอบครัว

- ร้อยละ 13 ของสตรีมีความคิดเห็นว่าสามี/คู่สมรสมีสิทธิทุบตีด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุ โดยพบว่าร้อยละ 11 เห็นด้วยต่อการใช้ความรุนแรงในกรณีที่ผู้เป็นมารดาไม่ดูแลบุตร
- การใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นสิ่งที่ยอมรับในสัดส่วนที่สูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 20) ครัวเรือนที่ยากจนและยากจนมาก (ร้อยละ 20 และร้อยละ 18 ตามลำดับ) ซึ่งความคิดเห็นต่อการเห็นควรใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีสัดส่วนสูงในกลุ่มสตรีที่ไม่มีการศึกษาและมีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 18) รวมทั้งสตรีอายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 17)

เอชไอวี/โรคเอดส์ และเด็กกำพร้า

ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี

- สตรีที่ถูกสัมภาษณ์ร้อยละ 97 เคยได้ยินเกี่ยวกับโรคเอดส์ อย่างไรก็ตามพบว่าร้อยละ 82 ของสตรีรู้วิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีทั้งสองวิธี โดยร้อยละ 89 รู้ว่าการซื้อสวตย์ต่อคู่นอนของตนเองที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ และร้อยละ 87 รู้ว่าการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ป้องกันการติดเชื้อได้

สตรีที่ไม่มีการศึกษาและสตรีในภาคเหนือมีความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีในสัดส่วนต่ำสุดเมื่อเทียบกับสตรีในกลุ่มอื่น ๆ (ร้อยละ 52 และร้อยละ 79 ตามลำดับ)

- ร้อยละ 59 ของสตรีสามารถระบุความเชื่อที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี ได้อย่างถูกต้องสองข้อ ได้แก่ การติดเชื้อไม่ได้เกิดจากการกินอาหารร่วมกันและถูกยุงกัด รวมทั้งทราบว่าคนที่ดูสุขภาพแข็งแรงก็อาจเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวีได้ โดยพบสัดส่วนสูงสุดในสตรีที่อยู่ในครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนเป็นคนไทยและสตรีที่มีการศึกษา
- ร้อยละ 93 ของสตรีรู้ว่าเชื้อเอชไอวีสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ ร้อยละ 74 รู้ว่าลูกติดเชื้อเอชไอวีได้ทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะตั้งครภ์ ระหว่างคลอด และให้นมบุตร ในขณะที่ร้อยละ 4 ไม่มีความเข้าใจในเรื่องที่ระบุข้างต้นนี้เลย สตรีในกรุงเทพมหานครและสตรีที่ไม่มีการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในสัดส่วนที่ต่ำกว่าสตรีในกลุ่มอื่น ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 63 และร้อยละ 47 ตามลำดับ
- เมื่อเปรียบเทียบการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกทั้ง 3 วิธี พบว่าสตรีทราบว่าเชื้อเอชไอวีสามารถถ่ายทอดได้ระหว่างการคลอดต่ำสุด คือ ร้อยละ 80 ในขณะที่อีก 2 วิธี คือ ถ่ายทอดระหว่างตั้งครภ์และระหว่างให้นมลูก มีสัดส่วนสูงกว่า คือ ร้อยละ 89 และร้อยละ 85 ตามลำดับ
- ร้อยละ 97 ของสตรีซึ่งเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคเอดส์ มีทัศนคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเอดส์ในสังคมอย่างน้อย 1 ข้อ โดยทัศนคติเชิงบวกที่พบสูงสุด คือ การดูแลสมาชิกครัวเรือนที่เป็นเอดส์ที่บ้าน (ร้อยละ 92) ในขณะที่ทัศนคติคิดบวกเรื่องการไม่เก็บไว้เป็นความลับหากมีสมาชิกในครัวเรือนป่วยเป็นเอดส์มีสัดส่วนต่ำที่สุดคือร้อยละ 54 โดยพบว่าสตรีที่มีการศึกษาสูง สตรีที่อยู่ในเขตเทศบาล และสตรีในครัวเรือนที่ร่ำรวยมากมีทัศนคติในยอมรับครบทั้ง 4 ตัวชี้วัดน้อยกว่าสตรีที่มีการศึกษาต่ำกว่า สตรีที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลและสตรีที่มีฐานะยากจน โดยเฉพาะสตรีที่อาศัยในกรุงเทพมหานครมีทัศนคติในการยอมรับในการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพียงร้อยละ 16

การตรวจหาเชื้อเอชไอวี

- ร้อยละ 81 ของสตรีทราบสถานที่ซึ่งสามารถตรวจเชื้อเอชไอวี และมีประมาณร้อยละ 50 ที่ได้ตรวจเชื้อ โดยพบว่า มีเพียงร้อยละ 9 ที่ตรวจหาเชื้อภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาและทราบผลการตรวจ
- ร้อยละ 78 ของสตรีอายุ 15-24 ปี ทราบสถานที่ซึ่งสามารถตรวจเชื้อเอชไอวี และมีประมาณร้อยละ 29 ที่ได้ตรวจเชื้อ และร้อยละ 10 ที่ตรวจเชื้อเอชไอวีภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาและทราบผลการตรวจ

เด็กกำพร้า

- ร้อยละ 58 ของเด็กอายุ 0-17 ปีในประเทศไทยอาศัยอยู่กับทั้งพ่อและแม่ ร้อยละ 15 อาศัยอยู่กับแม่เท่านั้น โดยพบว่าเกือบทั้งหมดพ่อของเด็กยังมีชีวิตอยู่ (ร้อยละ 14) ขณะที่ร้อยละ 3 อาศัยอยู่กับพ่อเท่านั้น ร้อยละ 23 ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ โดยเป็นเด็กที่พ่อและแม่ยังมีชีวิตอยู่ถึงร้อยละ 21
- เด็กในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่กับทั้งพ่อและแม่มีสัดส่วนต่ำกว่าภาคอื่น ๆ คือ ร้อยละ 56 และ 50 ตามลำดับ และพบว่าเด็กในครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนถึงยากจนมาก ประมาณ 2 ใน 3 ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด

การเข้าเรียนของเด็กกำพร้า

- เด็กอายุ 10-14 ปี ที่ทั้งพ่อและแม่เสียชีวิตแล้วมีร้อยละ 0.5 โดยพบว่าเด็กกลุ่มนี้ร้อยละ 92 กำลังเรียนหนังสือ ส่วนเด็กที่ทั้งพ่อและแม่ยังมีชีวิตอยู่และเด็กที่อยู่กับทั้งพ่อและ/หรือแม่ พบว่าร้อยละ 98 กำลังเรียนหนังสือ

ตารางสรุปตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด MICS4 และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ประเทศไทย พ.ศ. 2555										
ชื่อเรื่อง Topic	หมายเลข ตัวชี้วัด Indicator Number		ตัวชี้วัด Indicator	ทั่วราชอาณาจักร Whole Kingdom	กรุงเทพ มหานคร Bangkok	ภาค กลาง Central Region	ภาค เหนือ Northern Region	ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ Northeastern Region	ภาคใต้ Southern Region	ค่าของ ตัวชี้วัด Value
	MICS4	MDG								
ภาวะโภชนาการ (NUTRITION)										
ภาวะโภชนาการ Nutritional status	2.1a	1.8	น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Underweight prevalence)							
	2.1b		ปานกลางและรุนแรง (Moderate and Severe: - 2 SD)	9.2	7.9	7.3	7.8	10.7	10.0	%
	2.1b		รุนแรง (Severe - 3 SD)	2.1	2.4	1.7	1.4	2.5	2.3	%
	2.2a		ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง (Stunting prevalence)							
	2.2b		ปานกลางและรุนแรง (Moderate and Severe: - 2 SD)	16.3	16.2	13.6	13.8	18.9	16.7	%
	2.2b		รุนแรง (Severe: - 3 SD)	5.9	6.4	5.3	3.5	7.1	6.1	%
	2.3a		ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน (Wasting prevalence)							
	2.3b		ปานกลางและรุนแรง (Moderate and Severe: - 2 SD)	6.7	6.7	6.5	6.1	6.5	8.2	%
	2.3b		รุนแรง (Severe: - 3 SD)	2.2	1.9	2.3	1.8	2.3	2.6	%
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ การให้อาหารทารก Breastfeeding and infant feeding	2.4		เด็กที่เคยกินนมแม่ (Children ever breastfed)	96.8	93.7	95.8	97.6	97.7	97.6	%
	2.5		เด็กที่กินนมแม่ภายในชั่วโมงแรก หลังคลอด (Early initiation of breastfeeding)	46.3	29.2	40.9	49.6	47.0	60.9	%
	2.6		เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่ อย่างเดียว (Exclusive breastfeeding under 6 months)	12.3	8.2	7.9	19.6	13.8	12.2	%
	2.7		เด็กที่กินนมแม่ติดต่อกัน 1 ปี (Continued breastfeeding at 1 year)	32.4	23.0	27.6	21.6	38.1	40.5	%
	2.8		เด็กที่กินนมแม่ติดต่อกัน 2 ปี (Continued breastfeeding at 2 years)	17.8	12.5	17.3	13.4	18.0	24.2	%
	2.9		ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่ เป็นหลัก (Predominant breastfeeding under 6 months)	40.8	38.8	31.3	53.8	39.0	48.8	%
	2.10		ระยะเวลาของการกินนมแม่ (Duration of breastfeeding)	6.5	4.6	5.5	7.7	7.6	9.4	เดือน months
	2.11		เด็กอายุ 0-23 เดือนที่ดื่มของเหลว จากขวดที่มีจุกนมในระหว่างวัน ที่ผ่านมา (Bottle feeding)	72.7	83.2	79.3	67.5	73.0	61.0	%

ตัวชี้วัด MICS4 และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ประเทศไทย พ.ศ. 2555

ชื่อเรื่อง Topic	หมายเลข ตัวชี้วัด Indicator Number		ตัวชี้วัด Indicator	ทัวราช อาณาจักร Whole Kingdom	กรุงเทพ มหานคร Bangkok	ภาค กลาง Central Region	ภาค เหนือ Northern Region	ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ Northeastern Region	ภาคใต้ Southern Region	ค่าของ ตัวชี้วัด Value
	MICS4	MDG								
	2.12		ทารกอายุ 6-8 เดือนที่ได้รับอาหาร แข็ง อาหารเหลว อาหารอ่อน ในระหว่างวันที่ผ่านมา (Introduction of solid, semi- solid or soft foods)	74.8	(*)	87.4	71.7	75.4	72.5	%
	2.13		เด็กอายุ 6-23 เดือนที่ได้รับอาหาร แข็ง อาหารเหลว อาหารอ่อน ตามจำนวนครั้งขั้นต่ำหรือมากกว่า ในระหว่างวันที่ผ่านมา (Minimum meal frequency)	77.5	86.7	84.6	76.8	74.8	70.8	%
	2.14		เด็กอายุ 6-23 เดือนที่ได้รับอาหาร อย่างเพียงพอในระหว่างวัน ที่ผ่านไป (Age-appropriate breastfeeding)	20.9	10.9	17.9	21.3	23.2	24.6	%
	2.15		ความถี่ของการให้นมสำหรับเด็ก ที่ไม่ได้กินนมแม่ (Milk feeding frequency for non-breastfed children)	98.4	97.9	99.2	95.2	99.2	98.9	%
การบริโภค เกลือไอโอดีน Salt iodization	2.16		ครัวเรือนที่บริโภคเกลือที่มีไอโอดีน อย่างน้อย 15 ppm. (Iodized salt consumption)	70.9	82.1	79.9	77.3	54.0	80.1	%
น้ำหนักแรกคลอดต่ำ Low birth weight	2.18		ทารกที่มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 2,500 กรัม (Low-birth weight infants)	7.6	6.3	6.0	8.9	9.3	6.7	%
	2.19		ทารกที่ชั่งน้ำหนักเมื่อคลอด (Infants weighed at birth)	99.0	98.8	98.7	99.3	99.3	98.7	%

สุขภาพของเด็ก (CHILD HEALTH)

การได้รับวัคซีน Vaccinations	3.1		เด็กอายุ 12-23 เดือนที่ได้รับวัคซีน ป้องกันวัณโรคก่อนมีอายุครบ 1 ปี (Tuberculosis immunization coverage)	97.5	-	-	-	-	-	%
	3.2		เด็กอายุ 12-23 เดือนที่ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคโปลิโอ เข็มที่ 3 (OPV3) ก่อนมีอายุครบ 1 ปี (Polio immunization coverage)	89.0	-	-	-	-	-	%
	3.3		เด็กอายุ 12-23 เดือนที่ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ เข็มที่ 3 (DPT3) ก่อนมีอายุครบ 1 ปี (Immunization coverage for diphtheria, pertussis and tetanus (DPT))	87.9	-	-	-	-	-	%

ตัวชี้วัด MICS4 และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ประเทศไทย พ.ศ. 2555

ชื่อเรื่อง Topic	หมายเลข ตัวชี้วัด Indicator Number		ตัวชี้วัด Indicator	ทั่วราชอาณาจักร Whole Kingdom	กรุงเทพ มหานคร Bangkok	ภาค กลาง Central Region	ภาค เหนือ Northern Region	ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern Region	ภาคใต้ Southern Region	ค่าของ ตัวชี้วัด Value
	MICS4	MDG								
	3.4	4.3	เด็กอายุ 12-23 เดือนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ก่อนมีอายุครบ 1 ปี (Measles immunization coverage)	91.9	-	-	-	-	-	%
	3.5		เด็กอายุ 12-23 เดือนที่ได้รับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี เข็มที่ 3 ก่อนมีอายุครบ 1 ปี (Hepatitis B immunization coverage)	80.7	-	-	-	-	-	%
การป้องกันบาดทะยัก Tetanus toxoid	3.7		สตรีอายุ 15-49 ปีที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักอย่างน้อย 2 เข็มในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก่อนคลอด (Neonatal tetanus protection)	75.9	84.9	76.9	75.0	71.9	77.4	%
การดูแลเมื่อเจ็บป่วย Care of Illness	3.8		เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ท้องร่วงในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาและได้รับสารละลายเกลือแร่หรือให้ของเหลวเพิ่มขึ้น (ORT) ควบคู่ไปกับการกินอาหาร (Oral rehydration therapy with continued feeding)	52.7	60.3	56.7	42.5	55.8	50.4	%
	3.9		เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่สงสัยว่าเป็นโรคปอดบวมในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาและได้รับการดูแลที่เหมาะสม (Care seeking for suspected pneumonia)	83.3	(*)	(62.0)	(76.0)	95.5	(*)	%
	3.10		เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่สงสัยว่ามีอาการปอดบวมในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาและได้รับยาปฏิชีวนะ (Antibiotic treatment of suspected pneumonia)	45.4	(*)	(57.3)	(48.5)	41.8	(*)	%
การใช้เชื้อเพลิงแข็ง Solid fuel use	3.11		การใช้เชื้อเพลิงแข็งในการประกอบอาหาร (Solid fuels)	26.1	0.5	5.2	35.7	53.7	2.2	%

น้ำและสุขาภิบาล (WATER AND SANITATION)

น้ำและสุขาภิบาล Water and sanitation	4.1	7.8	สมาชิกในครัวเรือนที่ใช้น้ำดื่มจากแหล่งน้ำที่สะอาด (Use of improved drinking water sources)	97.0	100.0	98.6	94.6	98.8	89.6	%
	4.2		สมาชิกในครัวเรือนที่ใช้น้ำดื่มจากแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดแต่มีการบำบัดที่เหมาะสม (Water treatment)	13.5	-*	3.3	11.8	7.4	19.1	%

*ร้อยละ 100 ของสมาชิกในครัวเรือนใช้น้ำดื่มจากแหล่งน้ำที่สะอาด 100 per cent of the household population are using improved drinking water sources.

ตัวชี้วัด MICS4 และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ประเทศไทย พ.ศ. 2555

ชื่อเรื่อง Topic	หมายเลข ตัวชี้วัด Indicator Number		ตัวชี้วัด Indicator	ทัวราช อาณาจักร Whole Kingdom	กรุงเทพ มหานคร Bangkok	ภาค กลาง Central Region	ภาค เหนือ Northern Region	ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern Region	ภาคใต้ Southern Region	ค่าของ ตัวชี้วัด Value
	MICS4	MDG								
	4.3	7.9	สมาชิกในครัวเรือนที่มีการกำจัด สิ่งขี้ถ่ายที่ถูกสุขอนามัยและไม่ได้ ใช้ร่วมกับครัวเรือนอื่น (Use of improved sanitation)	97.2	94.9	98.5	97.5	96.9	97.0	%
	4.4		การกำจัดอุจจาระของเด็กอย่าง ปลอดภัย (Safe disposal of child's faeces)	56.9	44.7	53.1	67.1	63.0	44.5	%

อนามัยเจริญพันธุ์ (REPRODUCTIVE HEALTH)

การคุมกำเนิดและความ ต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์ Contraception and unmet need	5.1	5.4	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น (Adolescent birth rate)	60	45	60	47	73	53	ต่อ per 1,000
	5.2		สตรีอายุ 20-24 ปีที่ให้กำเนิดบุตร อย่างน้อย 1 คนก่อนอายุ 18 ปี (Early childbearing)	13.0	12.2	14.3	15.0	14.6	7.9	%
	5.3	5.3	สตรีอายุ 15-49 ปีที่สมรสและ กำลังคุมกำเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง (Contraceptive prevalence rate)	79.3	75.7	81.3	81.4	81.7	69.7	%
	5.4	5.6	ความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์ (Unmet need)	6.9	8.2	5.7	5.7	5.5	12.7	%
สุขภาพของแม่และ ทารกแรกเกิด Maternal and newborn health	5.5a	5.5	สตรีอายุ 15-49 ปีที่ได้รับ การตรวจ ครรภ์ (Antenatal care coverage) อย่างน้อย 1 ครั้งโดยบุคลากร วิชาชีพด้านสาธารณสุข (At least once by skilled personnel)	98.1	97.8	97.3	97.7	98.9	98.5	%
	5.5b		อย่างน้อย 4 ครั้งโดยบุคลากร ประเภทใดประเภทหนึ่ง (At least four times by any provider)	93.4	93.2	94.9	91.6	92.7	94.0	%
	5.6		สตรีอายุ 15-49 ปีที่ได้รับการวัด ความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะ และตรวจเลือดระหว่าง การตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้าย (Content of antenatal care)	98.0	96.6	97.1	98.5	98.6	98.9	%
	5.7	5.2	สตรีอายุ 15-49 ปีที่ได้รับการทำ คลอดโดยบุคลากรวิชาชีพด้าน สาธารณสุข (Skilled attendant at delivery)	99.6	99.7	99.9	99.0	99.8	99.2	%
	5.8		สตรีอายุ 15-49 ปีที่คลอดบุตรใน สถานพยาบาล (Institutional deliveries)	99.6	99.8	99.9	99.7	99.6	98.6	%
	5.9		การผ่าตัดคลอดบุตร (Caesarean section)	32.0	42.6	38.6	32.8	23.9	29.8	%

ตัวชี้วัด MICS4 และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ประเทศไทย พ.ศ. 2555

ชื่อเรื่อง Topic	หมายเลข ตัวชี้วัด Indicator Number		ตัวชี้วัด Indicator	ทั่วราชอาณาจักร Whole Kingdom	กรุงเทพมหานคร Bangkok	ภาค กลาง Central Region	ภาค เหนือ Northern Region	ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern Region	ภาคใต้ Southern Region	ค่าของ ตัวชี้วัด Value
	MICS4	MDG								

พัฒนาการของเด็ก (CHILD DEVELOPMENT)

พัฒนาการของเด็ก Child development	6.1		เด็กอายุ 36-59 เดือนที่อาศัยในครัวเรือนที่ผู้ใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย 4 กิจกรรมในช่วง 3 วันที่ผ่านมา (Support for learning)	92.7	93.5	92.7	90.7	93.4	92.9	%
	6.2		เด็กอายุ 36-59 เดือนที่พ่อแม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย 1 กิจกรรมในช่วง 3 วันที่ผ่านมา (Father's support for learning)	35.3	48.1	41.9	35.8	24.8	43.2	%
	6.3		เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีหนังสือสำหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่ม (Learning materials: children's books)	42.7	62.4	47.7	43.4	33.8	45.2	%
	6.4		เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีของเล่นอย่างน้อย 2 ประเภท (Learning materials: playthings)	70.8	66.3	69.5	68.8	70.3	78.4	%
	6.5		เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ (Inadequate care)	4.6	5.5	2.6	3.6	5.8	5.3	%
	6.6		ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (Early child development index)	91.5	91.8	96.1	87.9	90.4	91.0	%
	6.7		เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย (Attendance to early childhood education)	84.4	66.3	77.8	90.9	91.0	81.4	%

การศึกษา (EDUCATION)

การรู้หนังสือและการศึกษา Literacy and education	7.1	2.3	อัตราการรู้หนังสือของสตรีอายุน้อย (Literacy rate among young women age 15-24 years)	98.0	97.0	97.5	97.7	99.1	97.5	%
	7.2		เด็กในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เข้าเรียนในหลักสูตรก่อนวัยเรียนในปีที่แล้ว (School readiness)	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	%
	7.3		อัตราการแรกเข้าเรียนสุทธิ (Net intake rate in primary education)	75.3	83.2	77.9	76.6	69.5	79.7	%
	7.4	2.1	อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ปรับแล้ว) ระดับประถมศึกษา (Primary school net attendance ratio (adjusted))	95.7	96.4	95.9	95.5	95.3	96.1	%

ตัวชี้วัด MICS4 และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ประเทศไทย พ.ศ. 2555

ชื่อเรื่อง Topic	หมายเลข ตัวชี้วัด Indicator Number		ตัวชี้วัด Indicator	ทัวราช อาณาจักร Whole Kingdom	กรุงเทพ มหานคร Bangkok	ภาค กลาง Central Region	ภาค เหนือ Northern Region	ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ Northeastern Region	ภาคใต้ Southern Region	ค่าของ ตัวชี้วัด Value
	MICS4	MDG								
	7.5	2.2	อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ปรับแล้ว) ระดับมัธยมศึกษา (Secondary school net attendance ratio (adjusted))	78.8	82.0	77.4	80.7	80.8	71.3	%
	7.6		เด็กที่เรียนถึงขั้นปีสุดท้ายของระดับ ประถมศึกษา (Children reaching last grade of primary)	99.5	99.4	98.4	99.8	100.0	99.4	%
	7.7		อัตราการสำเร็จระดับประถมศึกษา (Primary completion rate)	106.8	108.6	122.4	122.6	94.3	100.4	%
	7.8		อัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา (Transition rate to secondary school)	98.5	98.9	98.3	98.8	98.5	97.7	%
	7.9	3.1	อัตราส่วนของหญิงต่อชายระดับ ประถมศึกษา (Gender parity index: primary school)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	อัตราส่วน ratio
	7.10	3.1	อัตราส่วนของหญิงต่อชายระดับ มัธยมศึกษา (Gender parity index: secondary school)	1.2	1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	อัตราส่วน ratio

การคุ้มครองเด็ก (CHILD PROTECTION)

การจดทะเบียนเกิด Birth registration	8.1		เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีการจด ทะเบียนเกิด (Birth registration)	99.4	99.9	99.3	99.0	99.9	99.0	%
การสมรสตั้งแต่อายุน้อย Early marriage	8.6		สตรีอายุ 15-49 ปีที่สมรสครั้งแรก ก่อนอายุครบ 15 ปี (Marriage before age 15 among women age 15-49 years)	2.7	2.5	2.8	2.8	2.7	2.4	%
	8.7		สตรีอายุ 20-49 ปีที่สมรสครั้งแรก ก่อนอายุครบ 18 ปี (Marriage before age 18 among women age 20-49 years)	14.7	11.6	12.1	14.6	19.1	12.8	%
	8.8		สตรีอายุ 15-19 ปีที่ขณะนี้สมรส หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา (Young women age 15-19 years currently married or in union)	16.3	12.3	16.4	15.1	18.4	15.4	%
	8.10a		สตรีที่ขณะนี้สมรสหรืออยู่กินฉันท์ สามีภรณากับคู่สมรสที่อายุแก่ กว่า 10 ปีขึ้นไป (Spousal age difference) สตรีอายุ 15-19 ปี (women age 15-19 years)	11.3	17.1	7.7	4.5	13.7	14.0	%
	8.10b		สตรีอายุ 20-24 ปี (women age 20-24 years)	13.1	12.5	15.0	16.9	11.8	9.2	%

ตัวชี้วัด MICS4 และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ประเทศไทย พ.ศ. 2555

ชื่อเรื่อง Topic	หมายเลข ตัวชี้วัด Indicator Number		ตัวชี้วัด Indicator	ทั่วราชอาณาจักร Whole Kingdom	กรุงเทพมหานคร Bangkok	ภาค กลาง Central Region	ภาค เหนือ Northern Region	ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern Region	ภาคใต้ Southern Region	ค่าของ ตัวชี้วัด Value
	MICS4	MDG								
ความรุนแรงในครอบครัว Domestic violence	8.14		สตรีอายุ 15-49 ปีซึ่งระบุว่ามีความเห็นสมควรหากสามีทำร้ายร่างกายภรรยาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างน้อย 1 สถานการณ์ (Attitudes toward domestic violence: women age 15-49 years)	13.1	7.0	6.6	14.8	19.8	13.9	%

เอชไอวี/โรคเอดส์ และเด็กกำพร้า (HIV/AIDS AND ORPHANED CHILDREN)

ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเอชไอวี/โรคเอดส์ HIV/AIDS knowledge and attitudes	9.1		สตรีอายุ 15-49 ปีที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์เป็นอย่างดี (Comprehensive knowledge about HIV prevention among women age 15-49 years)	52.4	51.9	60.0	55.6	48.3	43.9	%
	9.2	6.3	สตรีอายุ 15-24 ปีที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์เป็นอย่างดี (Comprehensive knowledge about HIV prevention among women age 15-24 years)	55.7	51.1	61.5	59.8	56.0	45.1	%
	9.3		สตรีอายุ 15-49 ปีที่ระบุวิธีการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ถูกต้องทั้ง 3 วิธี (Knowledge of mother-to-child transmission of HIV among women age 15-49 years)	74.0	63.8	80.7	72.9	74.9	69.9	%
	9.4		สตรีอายุ 15-49 ปีที่มีทัศนคติในการยอมรับการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ครบทั้ง 4 ข้อ (Accepting attitudes towards people living with HIV among women age 15-49 years)	30.5	16.0	23.8	48.1	36.9	24.0	%
	9.5		สตรีอายุ 15-49 ปีที่รู้จักสถานที่ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (Women who know where to be tested for HIV)	81.4	85.1	86.4	83.3	75.3	80.4	%
	9.6		สตรีอายุ 15-49 ปีที่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวีในช่วง 12 เดือนก่อนการสำรวจและทราบผลการตรวจ (Women who have been tested for HIV and know the results)	8.5	8.3	8.9	10.0	8.1	7.3	%

ตัวชี้วัด MICS4 และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ประเทศไทย พ.ศ. 2555

ชื่อเรื่อง Topic	หมายเลข ตัวชี้วัด Indicator Number		ตัวชี้วัด Indicator	ทั่วราชอาณาจักร Whole Kingdom	กรุงเทพมหานคร Bangkok	ภาค กลาง Central Region	ภาค เหนือ Northern Region	ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern Region	ภาคใต้ Southern Region	ค่าของ ตัวชี้วัด Value
	MICS4	MDG								
	9.8		สตรีอายุ 15-49 ปีที่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีระหว่างการฝากครรภ์ (HIV counselling during antenatal care)	77.1	79.1	75.9	87.8	79.8	64.2	%
	9.9		สตรีอายุ 15-49 ปีที่ได้รับการเสนอให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวี และได้รับการตรวจ รวมทั้งทราบผลการตรวจ (HIV testing during antenatal care)	72.8	82.9	78.7	83.6	69.1	55.1	%
เด็กกำพร้า Orphaned children	9.17		เด็กอายุ 0-17 ปีที่ไม่ได้อยู่อาศัยกับพ่อแม่ (Children's living arrangements)	22.8	13.0	18.5	23.2	31.2	12.5	%
	9.18		เด็กอายุ 0-17 ปีที่พ่อแม่หรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเสียชีวิต (Prevalence of children with one or both parents dead)	4.1	2.8	4.4	5.2	3.6	4.4	%
	9.19	6.4	เด็กอายุ 10-14 ปีที่พ่อแม่และแม่เสียชีวิต และกำลังเรียนหนังสือ (School attendance of orphans)	91.7	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	%
	9.20	6.4	เด็กอายุ 10-14 ปีที่พ่อแม่และแม่มีชีวิตและได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน และกำลังเรียนหนังสือ (School attendance of non-orphans)	97.7	99.1	97.6	98.6	97.5	96.5	%

หมายเหตุ

- ค่าที่เป็นดอกจัน (*) หมายถึง จำนวนของตัวหาร (ที่ยังไม่ถ่วงน้ำหนัก) สำหรับตัวชี้วัดนี้มีค่าต่ำกว่า 25 ค่าสังเกต
- ค่าที่อยู่ในวงเล็บ (.) หมายถึง จำนวนของตัวหาร (ที่ยังไม่ถ่วงน้ำหนัก) สำหรับตัวชี้วัดนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 25-49 ค่าสังเกต

Note

- Figures denoted by an asterisk (*) are based on denominators of 24 un-weighted cases and less.
- Figures shown in parenthesis (.) are based on denominators of 25-49 un-weighted cases.

